


Medoderm^{színezetlen}

100 ml
250 ml
1 liter

Bőrfertőtlenítőszer, sebészi bemosakodó
és higiénés kézfertőtlenítőszer



Általános leírás

A MEDODERM SZÍNEZETLEN alkoholos hatóanyagokat, kvaterner ammóniumbázist, és karbamid-hidrogén-peroxidot tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező bőrfertőtlenítő-, sebészi bemosakodó és kézfertőtlenítőszer. A MEDODERM SZÍNEZETLEN színtelen, jellegzetes illatú készítmény, amely bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt.

Alkalmazási terület

Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), injekciók, punkciók és műtéti bőrterület fertőtlenítésére, higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi kézfertőtlenítésre és sebészi bemosakodásra használható.

Tulajdonságok

- Nagyon gyors fertőtlenítést tesz lehetővé
- Aldehydmentes
- Bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt, meggátolja a bőr kirepedezését.

Összetétel

N,N-didecyl-N,N-dimetil-ammónium-klorid (0,19 %); Propán-1-oll (30 %); Etanol (47 %); Karbamid-hidrogén-peroxid(1,2-1,7%); Nemionos tenzid (0,08-0,12 %); Tejsav; Víz

Hatásspektrum

- Baktericid (MRSA is)
- Fungicid
- Virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló)
- Tuberkulocid

Alkalmazási koncentráció és behatási idő

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni

Bőrfertőtlenítés

injekciók, punkciók, vérvétel előtt	0,5-1 perc behatási idő
Műtéti beavatkozás előtt a bőrfertőtlenítés ideje	3 perc
(Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése:	10 perc behatási idő)
<u>Sebészi bemosakodás esetén</u>	5 x 1 perc behatási idő
<u>Higiénés kézfertőtlenítés esetén</u>	0,5 perc behatási idő
(Virucid hatás eléréséhez)	min. 1 perc behatási idő
(Tuberkulocid hatás eléréséhez)	min. 1 perc behatási idő

A fertőtlenítés végrehajtása

Bőrfertőtlenítés

Injekciók, punkciók előtt a bőrfelületet 0,5 perc behatási ideig kezeljük a készítménnyel.

Műtéti beavatkozás előtt a műtéti terület környékét kezeljük a készítménnyel, majd hagyjuk a felületre rászáradni. A beavatkozás csak 3 perc elteltével kezdhető.

színezetlen
Medoderm

színezetlen Medoderm

Sebészi bemosakodás

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkarokon, majd a műveletet még négyszer megismétljük. A sebészi bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyisége: 5 x 5 ml = 25 ml. A sebészi bemosakodás ideje: 5 x 1 perc = 5 perc.

Higiénés kézfertőtlenítés

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet a hatás eléréséhez szükséges ideig (normál fertőtlenítés 30 mp, egyéb hatás (virucid, tuberkulocid) hatás eléréséhez 1 perc) alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén.

Figyelmeztetés

- Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
- Nyílt láng közelében alkalmazni tilos!
- Elektromos eszközt csak teljesen száradást követően szabad alkalmazni!

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, szobahőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

Szállítási besorolás: UN 1993 RID/ADR 3 III.

Kiszerezés

- 100 ml (polietilén flakon szórófejjel)
- 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)

Engedélyszám: OTH 1433-3/2009

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.